

Recebido em: 21/12/2004
Aceito para publicação: 06/12/2005
Publicado on-line: 15/12/2006

Revista Ciência em Extensão
v.3, n.1, 2006
Artigo Original - ISSN: 1679-4605

ADOÇÃO DE CÃES NO MUNICÍPIO DE IBIÚNA – SP – BRASIL: ANÁLISE CRÍTICA².

Francisco Rafael Martins Soto^{*},
Alexandre Junqueira de Sousa^{**},
Marcia Regina Risseto^{***},
Bárbara Filomena Martins Soto Lima^{****}

RESUMO

Este trabalho teve por objetivo avaliar o programa de adoção de cães do Município de Ibiúna-SP. Para a sua realização, os cães foram adotados no canil da Prefeitura com seleção de futuros proprietários. Foram realizadas visitas sem prévio aviso aos proprietários de cães para avaliar as condições de saúde animal. Após um período mínimo de três meses após a adoção, foi aplicado um questionário para todos os proprietários dos cães adotados. A finalidade foi avaliar os motivos da adoção, adaptação do cão no domicílio e proprietário do mesmo, dificuldades encontradas e condições sanitárias e de saúde do animal. No período avaliado, foram adotados 63 cães, representando 10,21% do total recolhido, e a maioria destes foram machos. Mais de 90% dos proprietários tiveram uma boa e ótima adaptação com o cão. Os motivos da adoção estiveram centrados em gostar dos animais para 80,64% dos entrevistados. Doença foi a maior dificuldade. As condições sanitárias em que os animais foram encontrados nos domicílios estavam quase na totalidade em ótima e boa, representando sucesso nas adoções.

Palavras-Chave: cães, adoção, proprietário.

² Correspondência para/ Correspondence to

Francisco Rafael Martins Soto
Caixa Postal 34
Ibiúna – SP CEP 18150-000
Fone 0055 (15) 3294-2223- 3248-1880
Email: chicosoto@ig.com.br

^{*} Médico Veterinário, MSc, Doutorando em Medicina Veterinária pela FMVZ, USP, Diretor da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal do Centro de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses “Tereza Rodrigues de Camargo”, Ibiúna, SP, Brasil.

^{**} Médico Veterinário, Chefe do Setor de Zoonoses do Centro de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses “Tereza Rodrigues de Camargo”, Ibiúna, SP, Brasil.

^{***} Pedagoga, Coordenadora da Divisão de Vigilância Sanitária do Centro de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses “Tereza Rodrigues de Camargo”, Ibiúna, SP, Brasil.

^{****} Advogada, Coordenadora Pedagógica da Escola Monteiro- Anglo, Piedade, SP, Brasil.

Soto, F. R. M.; de Sousa, A. J.; Risseto, M. R.; Lima, B. F. M. S. Adoção de cães no município de Ibiúna-SP-Brasil: Análise crítica. Rev. Ciênc. Ext. v.3, n.1, p.26, 2006.

ADOPTION OF DOGS IN IBIÚNA- SP- BRAZIL : CRITICAL ANALYSIS

ABSTRACT

This work had the objective to evaluate the program of adoption of dogs at the city of Ibiúna-SP. For its fulfillment, dogs were adopted directly to the official kennel of Ibiúna, with selection of future owners. Visits were made without previous notice to the owners to evaluate the conditions of the animal health. After a minimum period of three months after adoption, it was applied a questionnaire to all owners. The objective was evaluate reasons for adoption, adaptation of dog in the home and owner, difficulties demonstrated and sanitary conditions and health of animal. In the period evaluated, 63 dogs were adopted, represented 10,21% of all removed and the majority were males. More of 90% owners had a good and very good adaptation with the dog. The motives of adoption had centralization in to like animals for 80,64% of interviewed. Disease was the major difficulty. The sanitary conditions in the animals were located in the homes were nearly in the totality in very good and good, represented success in the adoptions.

Key words: dogs, adoption, owners.

LA ADOPCIÓN DE CANES EN EL MUNICIPIO DE IBIÚNA- SP- BRASIL: ANÁLISIS CRÍTICO

RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el programa de adopción de canes en el distrito de Ibiúna. Para su realización los canes fueron adoptados directamente del canil de la municipalidad de Ibiúna, con la selección previa de los futuros propietarios. Fueron ejecutadas visitas sin anuncio previo a los propietarios para evaluar las condiciones de salud de los animales. Después de un período mínimo de tres meses de la adopción, fue aplicado un cuestionario a todos los propietarios de canes adoptivos. La finalidad fue la evaluación del motivo da la adopción, la adaptación del can en el hogar del propietario, dificultades encontradas y condiciones sanitarias y condiciones de la salud del animal. Durante el período de evaluación fueron adoptados 63 canes, representando el 10.21% del total recogidos y siendo la mayoría machos. Más del 90% de los propietarios tuvieron una buena adaptación con el can. Los motivos de la adopción estuvieron centrados en el gusto por los animales, 80.64% de los entrevistados. Problemas de salud fueron las mayores dificultades apuntadas. Las condiciones sanitarias en que los animales fueron encontrados eran en general buenas y óptimas, demostrando, así, el éxito de las adopciones.

Palabras Claves: Canes, adopción, propietario.

1. INTRODUÇÃO

As superpopulações caninas no mundo e nos municípios brasileiros representam um grave problema de saúde pública e bem estar animal (WHO, 1992). Diariamente chegam ao serviço de controle de zoonoses dos municípios, cães que foram abandonados pelos seus proprietários, agravando ainda mais o problema (ARCA BRASIL, 2003). No Município de Ibiúna - SP, em média são atendidas 300 notificações por ano, para recolhimento de cães nos domicílios ou de proprietários que levam o animal diretamente ao Centro de Controle de Zoonoses. Em 2003, SOTO identificou que a maior porcentagem e número de cães que eram recolhidos no município tinham proprietários, não sendo considerados animais de rua ou errantes. Identificou também que eram crescentes as solicitações dos munícipes para este tipo de serviço, e que a maioria eram cães saudáveis com uma parcela considerável de filhotes, muitos ainda sendo amamentados, podendo ser adotados. Como consequência, o número de animais em condição satisfatória de saúde que são eliminados, a cada ano, aumenta, gerando problemas principalmente de bem estar animal e, ainda, psicológicos dos funcionários municipais que eliminam estes animais com drogas letais dentro dos princípios éticos.

Vários caminhos alternativos têm sido propostos para minimizar ou controlar este problema, como trabalhos educativos de posse responsável com proprietários de cães e crianças, leis rigorosas de controle animal, programas de castração cirúrgica e química e adoção de cães (LARRIEU; ALVAREZ; CAVAGION, 1990; NASSAR; MOSIER, 1980; ROWAN, 1994). Cabe também às escolas de medicina veterinária trabalharem positivamente no sentido de incrementar a adoção de cães e controlar a superpopulação canina, castrando estes animais que são adotados (CLEVINGER; KASS, 2003). Somos ainda carentes de estudos que comprovem a eficiência destes programas (REICHMANN, 2000; SOTO, 2003).

Adoções bem sucedidas exigem a combinação entre proprietários e cães individualmente, o que ajustará melhor seu estilo de vida com as expectativas do proprietário do animal. As características de temperamento do animal e o estilo de vida do proprietário devem ser considerados. Pessoas, que adotam animais, devem ser preparadas para assumir um compromisso e entenderem como ir ao encontro das necessidades comportamentais e de saúde destes animais (HETTS, 1998).

Os proprietários necessitam ter expectativas realistas sobre a posse responsável de animais e necessitarão ajuda profissional, não apenas para cuidados médicos, como também para cuidados comportamentais (HETTS, 1998).

2. OBJETIVOS

- Mensurar o número de cães adotados sobre o total de recolhidos e a taxa de eutanásia destes.

- Avaliar o programa de adoção de cães no Município de Ibiúna-SP, em relação a adaptação do proprietário com o cão adotado, motivos da adoção, dificuldades encontradas pelo mesmo, e condições sanitárias e de saúde dos animais adotados .

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Processo de adoção implantado

Este programa de adoção de cães no Município de Ibiúna-SP, foi iniciado em janeiro de 2004, pelo Centro de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses do Município de Ibiúna-SP (CEVISA).

Os cães foram adotados somente no canil municipal do CEVISA. Não foram realizadas feiras de adoção. Para todas as pessoas interessadas em adotar um cão, houve uma entrevista realizada pelos médicos veterinários do CEVISA, com finalidade seletiva e de escolha do futuro proprietário do animal, com foco na posse responsável de cães. Houve também acompanhamento do cão com pelo menos uma visita, no pós-adoção no domicílio do proprietário, sem aviso prévio.

Todos os animais adotados foram cadastrados em fichas individuais. Os cães foram entregues aos proprietários devidamente vacinados contra raiva e tratados contra ectoparasitos e endoparasitos. Os proprietários também receberam informações sobre cuidados básicos de higiene, alimentação, saúde e bem estar animal a ser dado ao cão, na forma oral e escrita.

Após um período mínimo de três meses de o proprietário estar com o animal adotado, foi elaborado um questionário e este foi aplicado a todos os proprietários dos cães.

Elaboração e aplicação do questionário

O questionário foi elaborado segundo metodologia de Boruchovitch et al (1999) que descreveram em seus trabalhos que os processos de seleção de variáveis e desenvolvimento de métodos apropriados de colheita de dados estão entre os maiores desafios de um pesquisador. Sem métodos de alta qualidade, as conclusões de uma pesquisa estão seriamente comprometidas. Na aplicação do questionário, foram utilizadas questões abertas e fechadas, sendo entrevistados proprietários da zona rural e urbana do município. Buscou-se analisar quatro itens nas entrevistas: adaptação do cão no domicílio e proprietário do mesmo, motivos da adoção, dificuldades encontradas e condições sanitárias e de saúde do animal. Este último item foi avaliado através de exame clínico no cão adotado realizado pelo médico veterinário do CEVISA.

As entrevistas foram realizadas por dois entrevistadores, sendo um médico veterinário do CEVISA. Estes foram orientados de como realizá-las segundo metodologia de GERMANO (2002). Realizou-se entrevistas prévias a fim de avaliar a metodologia a ser utilizada no trabalho e o questionário a ser aplicado nos futuros proprietários dos cães adotados.

4. RESULTADOS

No período de janeiro a agosto de 2004, foram adotados 63 animais, do total de 620 animais recolhidos neste período, representando uma taxa de adoção de 10,16% e de eutanásia de 89,84%. A tabela 1 mostra o número de cães adotados segundo o sexo durante esta avaliação.

Tabela 1- Número de cães adotados segundo o sexo no período de janeiro a agosto de 2004, no Município de Ibiúna- SP.

Sexo dos animais/ total adotado	Nº de machos adotados	Nº de fêmeas adotadas	N °total adotado
Nº de animais adotados	45	18	63
% de adoção em relação ao sexo	71,43	28,57	100

Onde N° número, %- porcentagem.

Na tabela 2, são apresentados os resultados obtidos nas 63 entrevistas realizadas com os proprietários dos cães adotados em relação: a adaptação do proprietário e do cão no seu domicílio, motivos da adoção, dificuldades encontradas, condições sanitárias e de saúde do animal adotado.

Tabela 2. Porcentagem (%) de respostas obtidas dos proprietários de cães adotados no Município de Ibiúna- SP, no período de janeiro a agosto de 2004, às questões relativas às variáveis listadas e suas categorias.

Variável (questão)	Categorias da variável	% de respostas obtidas
Adaptação do proprietário e do cão no seu domicílio	Boa	57,69
	Ótima	38,46
	Ruim	3,84
Motivos da adoção	Gostar de animais	80,64
	Segurança	9,67
	Companhia	6,44
	Substituição do animal	3,22
Dificuldades encontradas	Sem dificuldades	72,23
	Doença do animal	16,63
	Temperamento do animal	11,11
Condições sanitárias e de saúde do animal adotado	Boa	57,69
	Ótima	38,46
	Ruim	3,84

Quanto ao destino dos cães, (65,78 %) dos proprietários ainda permaneciam com o animal, (15,78%) dos cães adotados morreram, (10,52%) foram doados para outras pessoas, (7,89 %) dos animais fugiram.

5. DISCUSSÃO

O trabalho mostrou que a grande maioria dos cães que foram entregues ao serviço de controle de zoonoses, principalmente por proprietários, não foram adotados, devendo estes ser eutanasiados. Esta porcentagem chegou quase a 90%. A eutanásia foi um mecanismo necessário para eliminar o excedente de cães, na sua grande parcela, animais saudáveis. Beaver et al (2001) citaram que este tipo de procedimento provoca nas pessoas que o executam um grande desgaste psicológico, principalmente os funcionários do departamento de zoonoses dos municípios. Entretanto, a eutanásia canina é ainda uma forma primária de controlar zoonoses. Não há viabilidade para o poder público de manter estes animais indefinidamente nos canis, devido ao custo de manutenção e a grande quantidade de animais que é recolhida diariamente (SOTO, 2000). Chegar a um ponto de equilíbrio entre bem estar animal e controle de zoonoses será um grande desafio para todos nós (NOVA, 1998). Alguns autores mostraram que podem ocorrer melhorias nas taxas de adoção de cães abandonados pelos seus proprietários: Hughes et al (2002) trabalhando com programas de adoção de cães observaram um aumento no número de cães adotados quando estes animais eram esterilizados e conseqüentemente uma redução de animais eutanasiados.

Com base nos resultados obtidos, a maioria dos animais que foram adotados no Município de Ibiúna foram machos. Este resultado segue a linha de raciocínio de Wells (2003): que cães machos e fêmeas são populações distintas, devido a comportamentos e condutas diferentes, e as pessoas têm uma clara preferência pelo sexo do animal por parte dos proprietários. O programa mostrou-se viável no aspecto do sucesso da adoção, pois a maioria dos proprietários ainda permanecem com os cães e estes, em condições satisfatórias de saúde e bem estar animal. O processo de seleção dos futuros proprietários pode ter sido um aspecto relevante, quando se priorizou a posse responsável dos cães. Souza et al (2002) descreveram num estudo desenvolvido no Município de Botucatu - SP, com proprietários de cães, que eram poucos os que zelavam pela saúde e bem estar animal, mostrando a necessidade de preparo destes proprietários com os seus animais, no aspecto da posse responsável. O comprometimento do futuro proprietário com o cão adotado em termos de posse responsável deve ser valorizado (SOTO, 2003, 2005).

As pessoas esperam que o cão traga para o seu lar uma vida melhor, com valores positivos, e estes são fundamentais na aquisição destes animais, mesmo quando se pondera as vantagens e desvantagens de se ter um animal no lar (BERGLER, 1988). Leslie et al (1999) obtiveram resultados semelhantes, em que companhia, amor e afeição foram os motivos mais freqüentes para a aquisição e reprodução dos cães. Mais informações são necessárias para ajudar a entendermos melhor a complexa interação que existe entre as pessoas, cães e

criadores. Estes dados são essenciais para delinear e promovermos a posse responsável de cães na comunidade (PATRONECK et al, 1995).

A segurança foi também um fator importante, as pessoas buscam nos cães a proteção dos seus lares. Isto se dá devido ao fato de o cão coexistir mais estreitamente com o homem, e está relacionado com aspectos emocionais que respondem a motivações e necessidades psicológicas (companhia), e físicas (segurança) (SOTO, 2003).

A doença dos animais foi a maior dificuldade encontrada pelos proprietários, e deve ser considerada, quando se observou que 15,78% dos proprietários entrevistados, os animais adotados morreram. Patroneck et al (1997), estudando a dinâmica populacional canina, mostraram que o destino de 33,8% dos cães domiciliados em St Joseph County - EUA foi a morte do animal. Rowan et al (1994) e Neidhart et al (2002), estudando proprietários de cães também nos EUA, mostraram que a maior dificuldade dos proprietários destes animais estava relacionada à doença do animal, com custos com veterinários.

Outra dificuldade relatada pelos proprietários entrevistados, foi o temperamento do animal, este pode ser um fator importante no abandono do cão e insucesso na adoção. Entretanto, Posage (1998) identificaram e relacionaram outras causas com o insucesso da adoção, entre elas: o tamanho do animal e cor da pelagem do mesmo.

6. CONCLUSÕES

- 1) Uma pequena parcela de cães recolhidos foi adotada, a maioria foi eutanasiada.
- 2) Cães machos foram os mais adotados no programa de adoção.
- 3) Há uma clara preferência das pessoas do Município de Ibiúna- SP, em adotar cães machos e rejeitar as fêmeas.
- 4) A seleção dos futuros proprietários de cães e acompanhamento no pós-adoção no programa, foram ações que provavelmente melhoraram a qualidade das adoções, principalmente nas condições sanitárias e de saúde em que os animais foram encontrados nos domicílios visitados e a sua adaptação.
- 5) Apesar da maioria dos animais estarem em condições sanitárias e de saúde satisfatórias, a doença dos cães foi a maior dificuldade relatada pelos proprietários entrevistados.
- 6) Gostar dos animais foi o principal motivo para a adoção dos cães abandonados.

7. BIBLIOGRAFIA

ARCA BRASIL. **Estatísticas 2003**. Disponível em: <<http://www.arcabrasil.com.br>>. Acesso em: 5 ago.2003.

BEAVER, V. B.; REED, W.; LEARY, S.; MCKIERNAN, B.; BAIN, F.; SCHULTZ, R.; BENNETT, T. B.; PASCOE, P.; SCHULL, E.; CORK, C. L.; FLOYD, F. R.; AMASS, D. K.; JOHNSON, R.; SCHMIDT, H. R.; UNDERWOOD, W.; THORNTON, W. G.; KOHN, B. Panel on euthanasia. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 218, n. 5, p. 34, Mar. 2001.

BERGLER, R. Man and Dog: The Psychology of a Relationship. **Blackwell Scientific Publications**. Oxford London Edinburg, Boston Palo Alto Melbourne, 188p, 1988.

BORUCHOVITCH, E.; SCHALL, V, T. Questionnaires in health education research. Advantages and disadvantages of open ended questions. Implications for health research methodology. **Ciência e Cultura Journal of the Brazilian Association for the Advancement of Science**, v.1 n. 51 p.12-15, 1999.

CLEVENGER; J.; KASS, P, H. Determinants of adoption and euthanasia of shelter dogs spayed neutered in the University of California Veterinary student surge: program compared to other shelter dogs. **Journal Veterinary Medical Education**, v.4 n.30 p.372-378, 2003.

GERMANO, M. I. S. Metodologia de pesquisa aplicada ao diagnóstico situacional. **Apostila Técnica**, v.1, n.1, p.10-23, out.2002.

HETTS, S. Doação de cães e gatos: Estratégias e cuidados. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DO BEM ESTAR ANIMAL, 1., 1998, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Associação Humanitária de Proteção e Bem Estar Animal, 1998, p.80.

HUGHES, K, L.; SLATER, M, R.; HALTER, L. The effects of Implementing a Feral Cat Spay / Neuter Program Florida County Animal Control Service. **Journal Applied Animal Welfare Science**, v.4, n.5, p.285-298, 2002.

LARRIEU, E.; ALVAREZ, T.; CAVAGION, L.; HERRASTI, A. Dinâmica de la poblacion canina de General Pico, Argentina em el período 1986/1990. **Veterinária Argentina**, v.9, n.88, p.242-247, jun.1990.

LESLIE, B. E.; MEEK, A. H.; KAWASH, G. F.; MCKEOWN, D. B. An epidemiological investigation of pet ownership in Ontário. **Canadian Veterinary Journal**, v.35, n. 4 p. 640-643, Sept.1999.

NASSAR, R.; MOSIER, J. E. Canine population dynamics: A study of the Manhattan, Kansas, canine population. **Journal American Veterinarian Research**, v.41, n. 11, p.1798-1803, Nov.1980.

NEIDHART, L.; BOYD, B. Companion animal adoption study. **Journal Applied Animal Welfare Science**, v.5, n.3, p.175-192, 2002.

NOVA, V. A. Controle de zoonoses e a interação com a sociedade. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DO BEM ESTAR ANIMAL, 1.; 1998, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Associação Humanitária de Proteção e Bem Estar Animal, 1998. p.60-62.

PATRONECK, G. J.; GLICKMAN, T. L.; BECK, A. M.; Dynamics of dog and cat population in a community. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v.210, n. 5, p.637-640, Mar.1997.

PATRONECK, G. J.; GLICKMAN, T. L.; MOYER, R. M. Population dynamics and the risk of euthanasia for dogs in an animal shelter. **Anthrozoös**, v. 8, n. 1, p. 31-43 Jan. 1995.

POSAGE, J. M.; BARTLETT, P. C.; THOMAS, D. K. Determining factors for successful adoption of dogs from an animal shelter. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v.213, n. 4, p.158-162, Dec.1998.

REICHMANN, M. L. A. B. **Controle de populações animais de estimação**. São Paulo: Instituto Pasteur, 2000. n. 6, 44p.

ROWAN, N. A. Shelters and pet overpopulation: a statistical black hole. **Anthrozoös**, v. 5, n. 3, p.140-143, Mar.1994.

SOTO, F.R.M.; FERREIRA, F.; PINHEIRO,S.R.; NOGARI, F.; RISSETO, M. R.;SOUZA, O.; AMAKU, M. Sheltered dogs adopted in Brazilian community: assessing the caretaker profile. **Journal of the Applied Animal Welfare-** August, Vol. 8, Number 2, 2005.

SOTO, F. R. M.; Dinâmica populacional canina no Município de Ibiúna-SP: estudo retrospectivo de 1998 a 2002 referente a animais recolhidos, eutanasiados e adotados. 2003. 100f. Dissertação (Mestrado em Epidemiologia Experimental e Aplicada às Zoonoses). Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

SOTO, F.R.M. Programa de adoção de cães no município de Ibiúna. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DO BEM ESTAR ANIMAL, 2.; 2000, Embu das Artes. Painel.... São Paulo: Associação Humanitária de Proteção e Bem Estar Animal, 2000.

SOUZA, C. L.; MODOLO, R. J.; PADOVANI, R. C.; MENDONÇA, O. A.; LOPES, S. L. A.; SILVA, B. W. Posse responsável de cães no município de Botucatu-SP: realidades desafios. **Revista de Educação Continuada do Conselho Regional de Medicina Veterinária – SP**, v. 5, n. 2, p. 226-232, 2002.

WELLS, D. L. Lateralised behavior in the domestic dog, *Canis familiaris*. **Journal of Experimental Psychology Animal Behavior Process**, v.61, n.1-2, p.27-35, Feb.2003.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Expert comitee on rabies. 8. ed. Geneva, Switzerland: WHO,1992. 87p. (Technical report series)